

Ficha Técnica



Devastador[®]

Paraquat

Nombre Común:

Paraquat Dichloride

Número de Registro:

7 - H 46/NA

Nombre Químico:

1,1' - dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride

Concentración de ingrediente activo:

240 g/l

Formulación:

concentrado soluble -SL

Clasificación Toxicológica:

II - Moderadamente Peligroso -**DAÑINO**

Descripción del producto

Es un herbicida de contacto, postemergente, que actúa en todos los tejidos vegetales verdes y es activo contra gramíneas anuales y malezas de hoja ancha. Devastador necesita de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, produciendo el colapso de la estructura celular y la posterior desecación de las plantas. Las condiciones soleadas, aceleran su acción herbicida.

Uso autorizado en borde de ÁREAS AGRÍCOLAS

PRODUCTO DE USO RESTRINGIDO, SOLO PARA EL CONTROL DE MALEZAS "Pactilla" (Rumex acetosella L.); "Diente de león" (Taraxacum dens-leonis Desf.) "Falso Llantén" (Plantago lanceolata L.); "Zapatito" (Calceolaria cf. mexicana Benth L.), flor blanca (Stellaria ovata)

Época y frecuencia de aplicación

Aplicar una vez por ciclo en bordes de áreas agrícolas cuando las malezas estén en activo crecimiento con más de 5 hojas desarrolladas y una altura promedio de 10 cm.

Compatibilidad

DEVASTADOR no es compatible con bases fuertes, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes. Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad a escala previa a la aplicación.

Modo de acción

DEVASTADOR actúa en presencia de la luz secando las partes verdes de todas las plantas con las cuales entra en contacto. Después de la aplicación, la penetración a través de la superficie foliar ocurre casi de inmediato. Esta absorción aumenta con alta intensidad de luz y humedad y por el adyuvante no iónico agregado en la formulación, que asegura una buena retención de la pulverización y humidificación del follaje al que se apunta.

Modo de empleo

En un recipiente adecuado para el efecto, mezclar la dosis recomendada de DEVASTADOR con un poco de agua hasta formar una solución homogénea, luego verterla en el tanque conteniendo la mitad del volumen de agua requerida, completar la cantidad a utilizar y agitar frecuentemente hasta conseguir una suspensión homogénea. No guardar la mezcla, preparar lo necesario para la aplicación.

Periodo de reingreso

No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

Periodo de carencia

No aplica

Dosis

1.5 a 3 l/ha según el tipo de maleza



Av. San Juan Bosco 5 y la N, Guasmo

■ Fertisa (Vía puerto Marítimo)

PBX: (593 4) 3846 640

■ Ventas: (593 4) 384 6541

■ Fax ventas: (593 4) 846 537