



INGREDIENTE ACTIVO: Deltametrina.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Concentrado emulsionable (EC) que contiene 25 g de ingrediente activo por litro de producto comercial.

ACCIÓN FITOSANITARIA: DECIS® es un insecticida piretroide que controla eficazmente insectos del orden de lepidópteros, coleópteros, homópteros y otros.

MODO DE ACCIÓN: DECIS® es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, produciendo inactividad de movimientos. Es un producto liposoluble, lo cual permite ser absorbido por la pared vegetal. Esta propiedad le permite tener una excelente resistencia al lavado en caso de lluvias fuertes.

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: En cultivos de ciclo corto se recomiendan máximo dos aplicaciones entre los primeros treinta días de desarrollo de la planta. En Rosa se recomiendan 2 aplicaciones en bloque cada 7 días durante la rotación.

PERIODO DE CARENCIA: Rosa no aplica.

PERIODO DE REINGRESO: 12 horas después de la aplicación.

MÉTODO DE APLICACIÓN: Vierta la mitad de agua y agregue la dosis recomendada de DECIS DECIS®, agite la mezcla y complete con agua el resto. Mantenga el agitador funcionando durante las operaciones de llenar, mezclar y rociar. Asegúrese de contar con el equipo necesario para dosificar, mezclar y aplicar el producto. Lavar el equipo al terminar la aplicación. Asegúrese de utilizar siempre el equipo de protección personal consistente en: botas de hule, mascarilla, anteojos protectores, guantes, dosificador y aplicador.

COMPATIBILIDAD DE MEZCLA: DECIS® es compatible con todos los pesticidas, inclusive se puede mezclar con Propanil en arroz sin problemas de fitotoxicidad. No es compatible con Caldo Bordelés, Arseniato de Calcio o Zinc.

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: II Moderadamente peligroso.

COMPATIBILIDAD CON EL CULTIVO: No presenta fitotoxicidad utilizado a la dosis recomendada y con los métodos sugeridos.

PRECAUCIONES: El producto puede ser nocivo en caso de inhalación o ingestión. Puede ser tóxico para organismos acuáticos. Almacene el producto fuera del alcance de los niños, bajo llave, en un sitio seguro, fresco, seco y bien ventilado, separado de alimentos y drogas de consumo humano o animal, ropa, calzado y utensilios del hogar.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de ingestión no induzca el vómito si el paciente está consciente. Mientras consigue asistencia médica, suministre al paciente los primeros auxilios generales.

GUÍA PARA EL MÉDICO: Aplique tratamiento sintomático.

Para mayor información dirigirse a:

Para la Sierra: CIATOX, Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Dra. Consuelo Meneses M, Teléfonos de contacto.: 593- 2- 2906162 Ext. 221/ 593- 2- 2565858 3226268 Línea gratuita: 1800 836366. En caso de intoxicación, derrame o incendio: Cisproquim (Quito, La Sierra, Centro y Norte): 1800-59-3005

Para la Costa: CITOX Centro de Información Toxicológico. Dr. Jorge Luis Gaibor Carpio Tel.: (5934)04245-1022 Móvil: 098275025 Fax: (5934)042452700 Ext. 4241. En caso de intoxicación accidental dirigirse al Dr. Alfredo Noboa Montalvo. Celular 09-9426154 (Guayaquil)



PRESENTACIONES:

Frasco x 100 cc
Envase x 1 L

REGISTRO: 21 - I 1 /NA

RECOMENDACIÓN DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS l/ha	PC (PERÍODO DE CARENCIA)
ROSA (<i>Rosa sp.</i>)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,3	NO APLICA
UVA (<i>Vitis vinifera L.</i>)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	*0,3	7 DÍAS